

Condado de Santa Clara

Departamento de Salud Pública

Prevención y control de las enfermedades transmisibles
150 West Tasman Drive, Suite 1A
San José, California 95134
(Tel) 408.885.4214
(Fax) 408.885.4249



AVISO DE EXPOSICIÓN: FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA/FIEBRE ESCARLATA

Fecha de publicación: _____

Estimado padre, tutor legal o personal:

Los estudiantes y el personal pueden haber estado expuestos recientemente a la **faringitis estreptocócica/ fiebre escarlata**. Le proporcionamos la siguiente información para que sepa qué medidas puede tomar para protegerse y proteger a los demás. Esta información no sustituye a la consulta con el médico en caso de enfermedad. ***Si usted o su hijo presentan síntomas, acuda lo antes posible con un proveedor de atención médica para recibir diagnóstico y tratamiento.***

FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA/FIEBRE ESCARLATA: Enfermedades causadas por bacterias muy contagiosas llamadas estreptococos del grupo A. Son más comunes en niños de 5 a 15 años y pueden tratarse con antibióticos.

¿Cuáles son los síntomas? Ambas enfermedades pueden causar fiebre, dolor al tragar, dolor de garganta y amígdalas rojas e hinchadas. Además, los síntomas de la fiebre escarlata incluyen una lengua "fresa" (roja y llena de bultos) y un sarpullido rojo que puede parecer papel de lija. El sarpullido suele aparecer en el cuello, el pecho, las axilas o la ingle.

¿Cómo se contagia? Por la inhalación de gotitas que se propagan por el aire cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. El virus también puede propagarse por contacto directo con la saliva o la mucosidad de una persona infectada o tocando superficies que tengan el virus.

¿Cuándo comienzan los síntomas? Entre 2 y 5 días después de la exposición a la bacteria.

¿Es necesario que el personal o los niños se queden en casa si presentan síntomas? Sí

¿Cuándo puede regresar el personal o los niños al trabajo, la escuela o la guardería? El niño o el miembro del personal pueden volver cuando lleven 24 horas sin fiebre sin utilizar medicamentos antifebriles y hayan transcurrido 24 horas desde el inicio del tratamiento antibiótico.

Para más información, visite [cdc.gov/groupastrep](https://www.cdc.gov/groupastrep).