



AVISO DE EXPOSICIÓN: AL IMPÉTIGO

Fecha de publicación: _____

Estimado padre, tutor legal o personal:

Los estudiantes y el personal pueden haber estado expuestos recientemente al **impétigo**. Le proporcionamos la siguiente información para que sepa qué medidas puede tomar para protegerse y proteger a los demás. Esta información no sustituye a la consulta con el médico en caso de enfermedad. ***Si usted o su hijo presentan síntomas, acuda lo antes posible con un proveedor de atención médica para recibir diagnóstico y tratamiento.***

EL IMPÉTIGO: Es una infección común de la piel causada por bacterias. El impétigo es más frecuente en niños de 2 a 5 años. Puede tratarse con antibióticos.

¿Cuáles son los síntomas? Granos o ampollas rojas que causan comezón y pueden soltar líquido y dejar costras amarillas. A menudo las ampollas aparecen en la cara, los brazos o las piernas, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.

¿Cómo se contagia? Tocar los granos o ampollas de una persona infectada o tocar el líquido de las ampollas. Los cortes o rasguños pueden aumentar el riesgo de contraer impétigo. No lavarse bien las manos ni el cuerpo también puede aumentar el riesgo.

¿Cuándo comienzan los síntomas? Normalmente, las ampollas aparecen 10 días después de la exposición.

¿Es necesario que el personal o los niños se queden en casa si presentan síntomas? Sí. Sin embargo, su hijo puede quedarse hasta el final del programa o horario escolar, pero debe mantener las ampollas cubiertas.

¿Cuándo puede regresar el personal o los niños al trabajo, la escuela o la guardería? El niño o el miembro del personal pueden regresar una vez iniciado el tratamiento de antibióticos, siempre que las ampollas estén cubiertas. Las ampollas deben mantenerse cubiertas hasta que se sequen.

Para más información, visite [cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html](https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html).