



THÔNG BÁO PHƠI NHIỄM: BỆNH CHỐC LỖ

Ngày ban hành: _____

Kính gửi Phụ huynh, Người giám hộ Hợp pháp, hoặc Nhân viên,

Các học sinh và nhân viên gần đây có thể đã bị phơi nhiễm với **bệnh chốc lở**. Chúng tôi cung cấp những thông tin dưới đây để quý vị biết được các bước quý vị có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác. Thông tin này không thể thay thế việc tham khảo với bác sĩ của quý vị nếu quý vị mắc bệnh. ***Nếu quý vị hoặc con em của quý vị có các triệu chứng, xin vui lòng tìm kiếm chẩn đoán và điều trị từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt.***

BỆNH CHỐC LỖ: Một sự nhiễm trùng trên da thông thường do vi khuẩn gây ra. Bệnh chốc lở thường phổ biến ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Các triệu chứng là gì? Các vết loét đỏ, ngứa có thể rò rỉ chất lỏng và để lại các vảy màu vàng có vỏ cứng. Các vết loét thường ở trên mặt, cánh tay, hoặc chân nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên cơ thể.

Bệnh lây lan như thế nào? Chạm vào các vết loét của người nhiễm bệnh hoặc chạm vào chất lỏng từ các vết loét. Các vết cắt hoặc vết trầy xước có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh chốc lở ở một người nào đó. Không rửa tay và tắm rửa cơ thể đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Khi nào thì các triệu chứng bắt đầu? Thông thường, các vết loét xuất hiện 10 ngày sau khi phơi nhiễm.

Nhân viên hoặc trẻ em có cần ở nhà nếu các triệu chứng phát triển hay không? Có. Tuy nhiên, con trẻ của quý vị có thể ở lại cho đến khi kết thúc chương trình hoặc ngày học nhưng phải giữ cho các vết phỏng rộp được che phủ.

Khi nào thì nhân viên hoặc trẻ em có thể trở lại sở làm, trường học, hoặc nhà chăm sóc trẻ? Trẻ em hoặc nhân viên có thể trở lại sau khi đã bắt đầu việc điều trị kháng sinh miễn là các vết phỏng rộp được che phủ. Các vết phỏng rộp phải được che phủ đến khi chúng khô lại.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html](https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-public/impetigo.html).