



Disease Prevention and Control  
976 Lenzen Avenue, Suite 1203  
San Jose, California 95126  
(Tel) 408.885.4214  
(Fax) 408.885.4249

---

## **AVISO DE POSIBLE CONTAGIO**

Estimados Padres:

Es posible que el día \_\_\_\_\_, su niño/a haya sido expuesto a la enfermedad contagiosa que se describe abajo. Esta información no reemplaza que usted hable con un proveedor de salud si su niño está enfermo. **Si su niño tiene síntomas, por favor acuda a su proveedor de salud para que le diagnostique y le dé el tratamiento necesario.**

### **ENFERMEDAD O CONDICIÓN CONTAGIOSA**

**ROSÉOLA (SEXTA ENFERMEDAD):** Una infección viral con sarpullido.

**¿Cuáles son los síntomas?** Fiebre (a menudo más alta de 103°F) la cual puede durar entre 3 a 7 días. El sarpullido rojo y elevado aparece el día que se quita la fiebre.

**¿Cómo se contagia?** Al tocar mucosidad de la nariz o saliva de alguien que tiene la infección.

**¿Cuándo empiezan los síntomas?** 5 a 15 días después de haberse expuesto al virus.

**¿Debe el niño quedarse en casa?** No. Si no tiene fiebre.

**¿Cuándo puede regresar a la escuela o guardería?** Los niños pueden regresar a la escuela 24 horas después de haberles dado fiebre (sin la necesidad de tomar Tylenol o Ibuprofen), y puedan completamente participar en las actividades de grupo.